nextmune

Immunothérapie sublinguale

Spray oral

Prise en charge et soulagement
à long terme des allergies

L'immunothérapie sublinguale est un moyen alternatif de traiter la dermatite atopique en plaçant l'extrait allergène dans la bouche de l'animal plutôt que de l'injecter par voie sous-cutanée.

Quand l'immunothérapie sublinguale est-elle une bonne alternative ?

- **Aversion pour les aiguilles (animal de compagnie ou propriétaire)**
  Il est plus facile pour certains propriétaires d'animaux de compagnie d'administrer un produit oral plutôt qu'un injectable. De nombreux animaux de compagnie préfèrent également un produit légèrement sucré placé dans leur bouche à une injection.

- **L'immunothérapie sublinguale est considérée comme ayant la meilleure inocuité** et doit être envisagée pour les animaux présentant un risque de réactions aux injections sous-cutanées.[1,2].

- **Certains animaux réagissent mieux à l'immunothérapie sublinguale**
  Si certains animaux ont mal répondu à l'immunothérapie injectable, on peut envisager l'immunothérapie sublinguale. Et vice-versa, certains animaux qui répondent mal à l'immunothérapie sublinguale répondent mieux à l'immunothérapie injectable[1,3].

- Administration facile
- Une fois par jour
- Inocuité : un minimum d'effets secondaires[1,2]
- Jusqu'à 12 allergènes par flacon
- 80 allergènes disponibles

- **Une routine quotidienne est plus facile pour certains propriétaires d'animaux de compagnie**
  Pour certains propriétairesd'animaux de compagnie, une administration quotidienne peut être plus facile à retenir et à respecter, favorisant ainsi l'observance.

Posologie

Chaque administration (compression pleine de la pompe) fournit 0,1 ml d'extrait allergène. L'immunothérapie sublinguale est administrée par pulvérisation dans la bouche, entre la gencive et la joue. Pas de nourriture et de boisson 10 minutes avant et après administration.

Présentations disponibles

Simple
Jusqu'à 5 mois de traitement

Double
Jusqu'à 10 mois de traitement

Poids	Dose
< 10kg	2 pulvérisations, une fois par jour
> 10kg	3 pulvérisations, une fois par jour

1 DeBoer D, Morris M. Multicentre open trial demonstrates efficacy of sublingual immunotherapy in canine atopic dermatitis. Vet. Dermatol 2012; 23 (suppl 1): 65
2 Marsella R, Ahrens K. Investigations on the effects of sublingual immunotherapy on clinical signs and immunological parameters using a canine model of atopic dermatitis: a double-blinded, randomized, controlled study. Vet Dermatol 2012; 23 (suppl 1): 66
3 Ozdemir C. An immunological overview of allergen specific immunotherapy – subcutaneous and sublingual routes. The Adv Respir Dis 2009; 3:253-262

nextmune

SLT0421FR1

Nextmune | 1 Place Paul Verlaine, 92100 Boulogne-Billancourt, France | Téléhone : (+33) 1 70 61 48 38
info.fr@nextmune.com | info.be@nextmune.com | www.nextmune.com